

第2類医薬品

日本薬局方

50mL

複方ヨド・グリセリン

Compound Iodine Glycerin

ルゴール液(コザカイ)

口腔用殺菌消毒剤



2023年8月改訂

この外箱の説明書は、本剤の使用前に必ずお読みください。
なお、必要なとき読めるよう大切に保管してください。

△使用上の注意

してはいけないこと【守らないと現在の症状が悪化したり副作用が起こりやすくなります。】
次の人は使用しないでください。

- (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (2) 口の中に傷やひどいただれのある人

■相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (3) 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (4) 授乳中の人
 - (5) 甲状腺機能障害の診断を受けた人
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
口	あれ、しみる、灼熱感、刺激感
消化器	吐き気
その他	不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診察を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、めまい、意識の混濁等があらわれる

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

開封口

第2類医薬品

日本薬局方

50mL

複方ヨド・グリセリン

Compound Iodine Glycerin

ルゴール液(コザカイ)

口腔用殺菌消毒剤



効能・効果

のどの殺菌・消毒

用法・用量

適宜、適量を患部に塗布する。

〈用法・用量に関連する注意〉

1. 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
2. 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い流してください。なお、症状が重い場合には、直ちに眼科医の診察を受けてください。
3. 塗布用のみ使用し、内服しないでください。
4. 定められた用法を厳守してください。
5. のどに塗るとき、綿等に薬液をしみこませずないように注意してください。
6. 薬液や薬液をしみこませた綿等を誤ってのみ込んだときは、直ちに医師の診察を受けてください。

成 分

本品50mL中に、ヨウ素 0.6g、液状フェノール 0.25mL、グリセリン 45mLを含みます。添加物としてヨウ化カリウム、ハッカ水を含みます。

保管及び取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)
4. 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

副作用被害救済制度の問合せ先
(株)医薬品医療機器総合機構

http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

〈吉田製薬お客様相談室〉

電話：03-3381-2004

受付時間：9:00～17:00(土、日、祝日を除く)



ヨシダ製薬

発売元

吉田製薬株式会社

東京都中野区中央5-4-40

製造販売元 小堺製薬株式会社

東京都墨田区両国4-36-9



ヨシダ製薬

発売元

吉田製薬株式会社

東京都中野区中央5-4-40

製造販売元 小堺製薬株式会社

東京都墨田区両国4-36-9