

制酸・緩下剤

酸化マグネシウム製剤

酸化マグネシウム錠200mg「ヨシダ」

酸化マグネシウム錠250mg「ヨシダ」

酸化マグネシウム錠300mg「ヨシダ」

酸化マグネシウム錠330mg「ヨシダ」

酸化マグネシウム錠400mg「ヨシダ」

酸化マグネシウム錠500mg「ヨシダ」

貯法：室温保存

有効期間：3年

Magnesium Oxide Tablets 「Yoshida」

	200mg	250mg	300mg	330mg	400mg	500mg
承認番号	22700AMX00714000	22700AMX00715000	22700AMX00716000	22700AMX00717000	22700AMX00718000	22700AMX00719000
販売開始	2001年7月	1999年7月	2008年8月	1999年7月	2008年8月	2005年9月

3. 組成・性状

3.1 組成

販売名	酸化マグネシウム錠200mg「ヨシダ」	酸化マグネシウム錠250mg「ヨシダ」	酸化マグネシウム錠300mg「ヨシダ」
有効成分(1錠中)	日局酸化マグネシウム200mg	日局酸化マグネシウム250mg	日局酸化マグネシウム300mg
添加剤	カルメロースカルシウム、クロスボビドン、ステアリン酸カルシウム、軽質無水ケイ酸、結晶セルロース		
販売名	酸化マグネシウム錠330mg「ヨシダ」	酸化マグネシウム錠400mg「ヨシダ」	酸化マグネシウム錠500mg「ヨシダ」
有効成分(1錠中)	日局酸化マグネシウム330mg	日局酸化マグネシウム400mg	日局酸化マグネシウム500mg
添加剤	カルメロースカルシウム、クロスボビドン、ステアリン酸カルシウム、軽質無水ケイ酸、結晶セルロース		

3.2 製剤の性状

販売名	酸化マグネシウム錠200mg「ヨシダ」	酸化マグネシウム錠250mg「ヨシダ」	酸化マグネシウム錠300mg「ヨシダ」	
性状	白色の素錠	白色の素錠	白色の素錠	
外形	表面	YO MG3	YO MG2	YO MG5
	裏面	200	250	300
	側面			
直径 (mm)	7.5	8	8.5	
厚さ (mm)	3.8	4.2	4.3	
重さ (mg)	240	300	360	
識別コード	YO MG 3	YO MG 2	YO MG 5	

販売名	酸化マグネシウム錠330mg「ヨシダ」	酸化マグネシウム錠400mg「ヨシダ」	酸化マグネシウム錠500mg「ヨシダ」	
性状	白色の素錠	白色の素錠	白色の素錠	
外形	表面	YO MG1	YO MG4	YO MG0
	裏面	330	400	500
	側面			
直径 (mm)	8.7	9.5	10	
厚さ (mm)	4.5	4.7	5.4	
重さ (mg)	396	480	600	
識別コード	YO MG 1	YO MG 4	YO MG 0	

4. 効能・効果

- 下記疾患における制酸作用と症状の改善
 - 胃・十二指腸潰瘍、胃炎（急・慢性胃炎、薬剤性胃炎を含む）、上部消化管機能異常（神経性食思不振、いわゆる胃下垂症、胃酸過多症を含む）
- 便秘症
- 尿路シュウ酸カルシウム結石の発生予防

6. 用法・用量

〈制酸剤として使用する場合〉

酸化マグネシウムとして、通常成人1日0.5～1.0gを数回に分割経口投与する。

〈緩下剤として使用する場合〉

酸化マグネシウムとして、通常成人1日2gを食前又は食後の3回に分割経口投与するか、又は就寝前に1回投与する。

〈尿路シュウ酸カルシウム結石の発生予防に使用する場合〉

酸化マグネシウムとして、通常成人1日0.2～0.6gを多量の水とともに経口投与する。

なお、いずれの場合も年齢、症状により適宜増減する。

8. 重要な基本的注意

8.1 本剤の投与により、高マグネシウム血症があらわれることがある。特に、便秘症の患者では、腎機能が正常な場合や通常用量以下の投与であっても、重篤な転帰をたどる例が報告されているので、以下の点に留意すること。[9.1.3、9.2、9.8、11.1.1、13.1、13.2 参照]

- 8.1.1 必要最小限の使用にとどめること。
- 8.1.2 長期投与又は高齢者へ投与する場合には定期的に血清マグネシウム濃度を測定するなど特に注意すること。
- 8.1.3 嘔吐、徐脈、筋力低下、傾眠等の症状があらわれた場合には、服用を中止し、直ちに受診するよう患者に指導すること。

9. 特定の背景を有する患者に関する注意

9.1 合併症・既往歴等のある患者

9.1.1 心機能障害のある患者

徐脈を起こし、症状が悪化するおそれがある。

9.1.2 下痢のある患者

下痢を悪化させるおそれがある。

9.1.3 高マグネシウム血症の患者

高マグネシウム血症の症状を増悪させるおそれがある。[8.1、11.1.1、13.1、13.2 参照]

9.2 腎機能障害患者

高マグネシウム血症を起こすおそれがある。[8.1、11.1.1、13.1、13.2 参照]

9.5 妊婦

妊婦又は妊娠している可能性のある女性には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。

9.6 授乳婦

治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又は中止を検討すること。

9.8 高齢者

投与量を減量するとともに定期的に血清マグネシウム濃度を測定するなど観察を十分に行い、慎重に投与すること。高マグネシウム血症を起こし、重篤な転帰をたどる例が報告されている。[8.1、11.1.1、13.1、13.2 参照]

10. 相互作用

10.2 併用注意（併用に注意すること）

本剤は吸着作用、制酸作用等を有しているため、他の薬剤の吸収・排泄に影響を与えることがある。

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
ポリカルボフィルカルシウム	ポリカルボフィルカルシウムの作用が減弱するおそれがある。	ポリカルボフィルカルシウムは酸性条件下でカルシウムが脱離して薬効を発揮するが、本剤の胃内pH上昇作用によりカルシウムの脱離が抑制される。
高カリウム血症改善イオン交換樹脂製剤（ポリスチレンスルホン酸カルシウム、ポリスチレンスルホン酸ナトリウム）	これらの薬剤の効果が減弱するおそれがある。また、併用によりアルカローシスがあらわれたとの報告がある。	マグネシウムがこれらの薬剤の陽イオンと交換するためと考えられる。
活性型ビタミンD ₃ 製剤（アルファカルシドール、カルシトリオール等）	高マグネシウム血症を起こすおそれがある。	マグネシウムの消化管吸収及び腎尿細管からの再吸収が促進するためと考えられる。
大量の牛乳、カルシウム製剤	これらの薬剤と併用した場合、これらの薬剤の作用が減弱するおそれがある。観察を十分に行い、このような症状が現れた場合には投与を中止すること。	機序：代謝性アルカローシスが持続することにより、尿管でのカルシウム再吸収が増大する。危険因子：高カリウム血症、代謝性アルカローシス、腎機能障害のある患者。
リオシグアト	本剤との併用によりリオシグアトの血中濃度が低下するおそれがある。本剤はリオシグアト投与後1時間以上経過してから服用させること。	消化管内pHの上昇によりリオシグアトのバイオアベイラビリティが低下する。
ロキサデュスタット バダデュスタット	これらの薬剤と併用した場合、これらの薬剤の作用が減弱するおそれがある。	機序不明
炭酸リチウム	高マグネシウム血症を起こすおそれがある。	機序不明
H ₂ 受容体拮抗薬（ファモチジン、ラニチジン、ラファジン等） プロトンポンプインヒビター（オメプラゾール、ランソプラゾール、エソメプラゾール等）	本剤の緩下作用が減弱するおそれがある。	胃内のpH上昇により本剤の溶解度が低下するためと考えられる。
ミソプロストール	下痢が発現しやすくなる。	ミソプロストールは小腸の蠕動運動を亢進させ、小腸からの水・Naの吸収を阻害し、下痢を生じさせる。本剤には緩下作用があるので、両者の併用で下痢が発現しやすくなる。

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
テトラサイクリン系抗生物質（テトラサイクリン、ミノサイクリン等） ニューキノロン系抗菌剤（シプロフロキサシン、トスフロキサシン等） ビスホスホン酸塩系骨代謝改善剤（エチドロロン酸ナトリウム、リセドロロン酸ナトリウム等） 抗ウイルス剤（ラルテグラビル、エルビテグラビル・コビシスタット・エムトリシタビン・テノホビル ジソプロキシルフマル酸塩等）	これらの薬剤の吸収が低下し、効果が減弱するおそれがあるため、同時に服用させないなど注意すること。	マグネシウムと難溶性のキレートを形成し、薬剤の吸収が阻害される。
セフジニル セフポドキシム プロキセチル ミコフェノール酸 モフェチル ペニシラミン		機序不明
アジスロマイシン セレコキシブ ロスバスタチン ラベプラゾール ガバペンチン	これらの薬剤の血中濃度が低下するおそれがある。	
ジギタリス製剤（ジゴキシン、ジギトキシン等） 鉄剤 フェキシソフェナジン	これらの薬剤の吸収・排泄に影響を与えることがあるため、服用間隔をあけるなど注意すること。	マグネシウムの吸着作用または消化管内・体液のpH上昇によると考えられる。

11. 副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

11.1 重大な副作用

11.1.1 高マグネシウム血症（頻度不明）

呼吸抑制、意識障害、不整脈、心停止に至ることがある。悪心・嘔吐、口渴、血圧低下、徐脈、皮膚潮紅、筋力低下、傾眠等の症状の発現に注意するとともに、血清マグネシウムの濃度の測定を行うこと。[8.1、9.1.3、9.2、9.8、13.1、13.2 参照]

11.2 その他の副作用

	頻度不明
消化器	下痢等
電解質	血清マグネシウム値の上昇

13. 過量投与

13.1 症状

血清マグネシウム濃度が高値になるにつれ、深部腱反射の消失、呼吸抑制、意識障害、房室ブロックや伝導障害等の不整脈、心停止等があらわれることがある。[8.1、9.1.3、9.2、9.8、11.1.1 参照]

13.2 処置

大量服用後の間もない場合には、催吐並びに胃洗浄を行う。中毒症状があらわれた場合には、心電図並びに血清マグネシウム濃度の測定等により患者の状態を十分に観察し、症状に応じて適切な処置を行うこと（治療にはグルコン酸カルシウム静注が有効であるとの報告がある）。なお、マグネシウムを除去するために血液透析が有効である。[8.1、9.1.3、9.2、9.8、11.1.1 参照]

14. 適用上の注意

14.1 薬剤交付時の注意

PTP包装の薬剤はPTPシートから取り出して服用するよう指導すること。PTPシートの誤飲により、硬い鋭角部が食道粘膜へ刺入し、更には穿孔を起こして縦隔洞炎等の重篤な合併症を併発することがある。

15. その他の注意

15.1 臨床使用に基づく情報

長期・大量投与により胃・腸管内に結石を形成し、腸閉塞を起こしたとの報告がある。

17. 臨床成績

17.1 有効性及び安全性に関する試験


17.1.1 国内臨床試験

酸化マグネシウム錠250mg「ヨシダ」を用い常習性便秘を対象とした2施設46例のクロスオーバー比較試験の臨床試験において、改善以上の改善率は87.0%（40/46）であった¹⁾。酸化マグネシウム錠330mg「ヨシダ」を用い常習性便秘を対象とした2施設49例のクロスオーバー比較試験の臨床試験において、改善以上の改善率は93.9%（46/49）であった²⁾。両臨床試験95例の副作用として、腹痛1例（1.1%）、軽度の下痢1例（1.1%）が認められ、9例（9.5%）に血漿中マグネシウム濃度の軽微な上昇が認められた。

18. 薬効薬理

18.1 作用機序

本剤は胃内における制酸作用と腸内における緩下作用を持つ。胃酸との中和反応は次式による。



制酸作用の発現に際して、CO₂を発生しないため刺激のない制酸剤として奨用される。本剤1gは0.1mol/L HClの約500mLを中和できる。本剤は水に不溶性なので、NaHCO₃に比較すると制酸性は遅効性で、作用時間も長い。中和によって生じるMgCl₂はCO₂を吸収するので、NaHCO₃と配合され

ることが多い。また、腸内では難吸収性の重炭酸塩又は炭酸塩となり、浸透圧維持のため腸壁から水分を奪い腸管内容物を軟化することにより緩下作用を現す。本剤は非吸収性であり、アルカローシスを生じない³⁾。

18.2 生物学的同等性

18.2.1 制酸作用

〈酸化マグネシウム錠250mg「ヨシダ」、酸化マグネシウム錠330mg「ヨシダ」〉

酸化マグネシウム錠250mg「ヨシダ」及び酸化マグネシウム錠330mg「ヨシダ」と標準製剤日局酸化マグネシウムの制酸作用について、日局の制酸力試験並びにFuchsの方法により比較した結果、両剤の生物学的同等性が確認された⁴⁾。

〈酸化マグネシウム錠200mg「ヨシダ」、酸化マグネシウム錠300mg「ヨシダ」、酸化マグネシウム錠400mg「ヨシダ」、酸化マグネシウム錠500mg「ヨシダ」〉

酸化マグネシウム錠200mg「ヨシダ」、酸化マグネシウム錠300mg「ヨシダ」、酸化マグネシウム錠400mg「ヨシダ」及び酸化マグネシウム錠500mg「ヨシダ」と標準製剤酸化マグネシウム錠250mg「ヨシダ」の制酸作用について、日局の制酸力試験並びにFuchsの方法により比較した結果、両剤の生物学的同等性が確認された⁵⁾。

18.2.2 溶出試験

〈酸化マグネシウム錠250mg「ヨシダ」、酸化マグネシウム錠330mg「ヨシダ」〉

酸化マグネシウム錠250mg「ヨシダ」及び酸化マグネシウム錠330mg「ヨシダ」は「昭和57年5月31日薬審452号の溶出試験法に関する基準」に基づき、日局酸化マグネシウムを標準製剤としたとき、溶出挙動が等しく、生物学的に同等とみなされた⁶⁾。

〈酸化マグネシウム錠200mg「ヨシダ」、酸化マグネシウム錠300mg「ヨシダ」、酸化マグネシウム錠400mg「ヨシダ」、酸化マグネシウム錠500mg「ヨシダ」〉

酸化マグネシウム錠200mg「ヨシダ」、酸化マグネシウム錠300mg「ヨシダ」、酸化マグネシウム錠400mg「ヨシダ」及び酸化マグネシウム錠500mg「ヨシダ」は「昭和57年5月31日薬審452号の溶出試験法に関する基準」に基づき、酸化マグネシウム錠250mg「ヨシダ」を標準製剤としたとき、溶出挙動が等しく、生物学的に同等とみなされた⁷⁾。

19. 有効成分に関する理化学的知見

一般的名称：酸化マグネシウム（Magnesium Oxide）

分子式：MgO

分子量：40.30

性状：酸化マグネシウムは白色の粉末又は粒で、においはない。水、エタノール(95)又はジエチルエーテルにほとんど溶けない。希塩酸に溶ける。空气中で湿気及び二酸化炭素を吸収する。

20. 取扱い上の注意

20.1 開封後は湿気を避けて保管すること。

20.2 金属と擦れることにより黒色になることがある。

22. 包装

〈酸化マグネシウム錠200mg「ヨシダ」〉

バラ：100錠（ポリ容器）

PTP包装：100錠（10錠×10）、1000錠（10錠×100）

〈酸化マグネシウム錠250mg「ヨシダ」〉

バラ：100錠（ポリ容器）

PTP包装：100錠（10錠×10）、210錠（21錠×10）、

1000錠（10錠×100）、2100錠（21錠×100）

〈酸化マグネシウム錠300mg「ヨシダ」〉

バラ：500錠（ポリ容器）

PTP包装：100錠（10錠×10）、1000錠（10錠×100）

〈酸化マグネシウム錠330mg「ヨシダ」〉

バラ：500錠（ポリ容器）

PTP包装：100錠（10錠×10）、210錠（21錠×10）、
1000錠（10錠×100）、2100錠（21錠×100）

〈酸化マグネシウム錠400mg「ヨシダ」〉

バラ：500錠（ポリ容器）

PTP包装：100錠（10錠×10）、1000錠（10錠×100）

〈酸化マグネシウム錠500mg「ヨシダ」〉

バラ：500錠（ポリ容器）

PTP包装：100錠（10錠×10）、210錠（21錠×10）、
1000錠（10錠×100）、2100錠（21錠×100）

23. 主要文献

- 1) 加賀谷寿孝 他：診療と新薬 1998；35（9）：829-855
- 2) 崎村恭也 他：薬理と治療 1998；26（6）：1027-1053
- 3) 第十八改正日本薬局方解説書 廣川書店．2021：C-2112-C-2117
- 4) 吉田製薬株式会社 社内資料：制酸効果（250mg、330mg）
- 5) 吉田製薬株式会社 社内資料：制酸効果（200mg、300mg、400mg、500mg）
- 6) 吉田製薬株式会社 社内資料：溶出試験（250mg、330mg）
- 7) 吉田製薬株式会社 社内資料：溶出試験（200mg、300mg、400mg、500mg）

24. 文献請求先及び問い合わせ先

吉田製薬株式会社 学術部

〒164-0011 東京都中野区中央5-1-10

TEL 03-3381-2004

FAX 03-3381-7728

26. 製造販売業者等

26.1 製造販売元



吉田製薬株式会社

埼玉県狭山市南入曽951