

ポピヨドン[®]ガーグル7% 30mL×50 包装仕様変更およびにおい変更のお知らせ

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、このたびポピヨドン[®]ガーグル7% 30mL×50の「包装仕様」および「におい」を変更いたしますので、下記のとおりお知らせ申し上げます。
今後とも弊社製品をご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

【変更内容】

- 容器のデザイン・形状を変更します。
- 個装箱のデザイン、中仕切りの形状を変更します。
- 変動情報（製造番号・使用期限）を含むGS1バーコードを表示します。
- 個装・外装（段ボール）のサイズを変更します。
- 「におい」を変更します。
- 患者様向け使用方法説明書の内容を改訂します。

※250mL製品につきましても「におい」変更を予定しております。変更品出荷予定時期等は改めてご案内申し上げます。



【患者さま用お知らせ】

- しばらくの間、患者さま用お知らせカードを製品に封入いたします（25枚2束）。

患者様へ

容器の形状とにおいが変わりました。
お薬の効果は変わりありませんので、
従来どおりご使用下さい。

※追加でご入用の場合は、弊社ホームページにも掲載いたしますのでご利用ください。

裏面もご覧ください

【使用方法説明書】


■ 使用方法説明書の内容を改訂します。

※「用法・用量」に変更はありません。

〈改訂前〉

■ ポピヨドンガーグル 7% の使用方法
(1回量として)

目には入れないこと



水を60mL (コップ約 $\frac{1}{3}$) 入れる。通常のうがいの場合は本剤2mL (1目盛) を症状の激しい場合は本剤4mL (2目盛) を入れる。軽くふりまぜてうがいして下さい。

以上の方法で、1日数回うがいして下さい。“使用のつどうすめてください。”

〈改訂後〉


ポピヨドンガーグル 7% の使用方法

目には入れないこと

■ 使用方法
本剤2mL (1目盛) ~4mL (2目盛) を水約60mL (普通のコップの約 $\frac{1}{3}$) にうすめて、1日数回うがいでください (15~30倍にうすめる)。

■ 注意

1. うがいだけに使用して下さい。
2. 使用時にうすめて早めに使用して下さい。
3. 小児の手の届かないところに保管して下さい。



本剤 1~2目盛をコップに入れる

コップ 約 $\frac{1}{3}$ まで水でうすめる

1日に数回うがいます

202102

【対象製品・変更時期】

■ 現行品の在庫消尽以降、変更品に切り替えて出荷させていただきます。

■ 流通在庫の関係から変更品がお手元に届くまでに若干の遅速が生じますが、ご了承くださいませようお願い申し上げます。

品名 薬価基準収載医薬品コード	包装規格	統一商品コード 販売包装単位コード 調剤包装単位コード	初回製造番号 使用期限	出荷 予定時期
ポピヨドンガーグル7% 2260701F1255	30mL×50	288212805 (01)14987288212802 (01)04987288212041	421801 2024年3月	2021年 12月

※コード類の変更はございません。

※しばらくの間、個装・外装 (段ボール) に **包装・におい変更品** の表示を致します。

【個装・外装サイズ】

現行品		変更品	
350×190×90	個装 縦×横×高 (mm)	330×180×86	
2,200g	重量	2,360g	
390×370×195	外装 縦×横×高 (mm)	370×350×200	
9kg	総重量	10kg	
4	梱包入数	4	

以上

21-032
491200