

速乾性手指消毒薬 薬価基準未収載

ベルコム®ローション

ベンザルコニウムエタノール製剤



医療従事者の手指衛生に



特徴

- 殺菌作用は**迅速**かつ**持続性**があります。
- 広範囲の細菌、真菌、一部のウイルスなどに対して**幅広い抗菌スペクトル**を示します。
- 容器は**減容**して廃棄できます (500mL・1L)。
- **センサー式非接触オートディスペンサー**を用意しています (別売り)。

有効性

殺菌活性の持続性


ベルコム®ローションのヒト皮膚塗抹後における経時的な殺菌活性を消毒用エタノールと比較した。

薬剤塗抹30分、180分及び360分後に供試菌(黄色ブドウ球菌、表皮ブドウ球菌、腸球菌(*E.hirae*)、緑膿菌、大腸菌、カンジダ)を接種し、5分間作用させたときの殺菌活性を評価した。

その結果、ベルコム®ローションのヒト皮膚塗抹180分後における6菌種の平均LRVは1.4(減菌率96.0%)となり、持続的な殺菌効果を認めた。

*LRV:対数減少値

社内資料:ヘキサック®ローション及びベルコム®ローションのヒト皮膚における殺菌活性の残存性の検討(一部改変)



皮膚塗抹後の殺菌活性(6菌種の平均LRV)

2. 禁忌 (次の患者には投与しないこと)

損傷皮膚及び粘膜には使用しないこと[刺激作用を有する。]



ヨシダ製薬

速乾性手指消毒薬の消毒手順



1 消毒薬適量を手のひらに取ります。
(ポンプを1回押しと霧状に約3mLです。)



2 両手の指先を消毒薬に浸します。



3 手のひらに塗り広げます。



4 両手の手の甲全体に塗り広げます。



5 指を交差させ指の間に塗り広げます。



6 両手の親指に塗り広げます。



7 全体的に塗り広げ終わったら
自然に乾燥させてください。



飲用不可



火気厳禁

ベルコム®ローション よくある質問

Q1. ベルコム®ローションは1プッシュ何mLですか?

A1. 500mL、1L包装は、1プッシュ約3mLです。80mL(携帯用)包装は、1プッシュ約0.7mLです。

Q2. ベルコム®ローションのエタノールの含量はどのくらいですか?

A2. ベルコム®ローション 100mL中に日局エタノール*が83mL含まれることから、エタノール含量は約80vol%となります。*日局エタノール:エタノール95.1~96.9vol%

Q3. 専用のディスペンサーはありますか?

A3. 500mL、1L包装は専用のマウンティングキットを用意しております。80mL(携帯用)包装は、クリップ付リールを用意しております。

※マウンティングキット、クリップ付リールは非売品です。ご入用の際は、弊社MRにお問合せください。

2024年1月改訂(第1版)

速乾性手指消毒薬
ベンザルコニウムエタノール製剤 薬価基準未記載

貯法: 室温保存
有効期間: 3年(ラベル等に記載)

ベルコム®ローション
Belcom Lotion

| | |
|------------|------------------|
| 日本標準商品分類番号 | 872619 |
| 承認番号 | 20600AMZ00199000 |
| 販売開始 | 1994年4月 |

2. 禁忌(次の患者には投与しないこと)

損傷皮膚及び粘膜には使用しないこと[刺激作用を有する。]

3. 組成・性状

3.1 組成

| | |
|------|---|
| 有効成分 | 100mL中 日局濃ベンザルコニウム塩化物液50 0.4g (ベンザルコニウム塩化物0.2gを含む。) |
| 添加剤 | エタノール、トリイソオクタン酸グリセリン、N-ココイル-L-アルギニンエチルエステルDL-ピロリドンカルボン酸塩、香料 |

3.2 製剤の性状

| | |
|----|-----------------|
| 性状 | 無色透明な液で、特異臭がある。 |
|----|-----------------|

4. 効能又は効果

医療施設における医師、看護師等の医療従事者の手指消毒

6. 用法及び用量

〈医療従事者の通常の手指消毒〉

約3mLを1回手掌に取り、乾燥するまで摩擦。ただし、血清、膿汁等の有機物が付着している場合は、十分に洗い落した後、消毒を行う。

〈術前・術後の術者の手指消毒〉

手指及び前腕部を石ケンでよく洗浄し、水で石ケン分を十分洗い落した後、約3mLを手掌に取り、乾燥するまで摩擦し、更に消毒を2回繰り返す。

11. 副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には使用を中止するなど適切な処置を行うこと。

11.2 その他の副作用

| | |
|-----|-------------|
| | 頻度不明 |
| 過敏症 | 紅斑、そう痒感、浮腫等 |
| 皮膚 | 刺激症状 |

14. 適用上の注意

14.1 薬剤使用時の注意

- 14.1.1 手指消毒以外の目的には使用しないこと。
- 14.1.2 本剤は希釈せず、原液のまま使用すること。
- 14.1.3 眼に入らないよう注意すること。入った場合には水でよく洗い流すこと。
- 14.1.4 反復使用した場合には脱脂等による皮膚荒れを起こすことがあるので注意すること。
- 14.1.5 血清、膿汁等の有機性物質は殺菌作用を減弱させるので、これらが付着している場合は十分に洗い落としてから使用すること。
- 14.1.6 石けん類は本剤の殺菌作用を弱めるので、予備洗浄に用いた石けん分を十分に洗い落としてから使用すること。
- 14.1.7 引火性があり、爆発の危険性もあるため、火気には十分注意すること。
- 14.1.8 本剤で消毒した手指で2.5kg以下の低出生体重児を取扱う場合、低出生体重児の皮膚がかぶれることがあるので十分注意すること。

20. 取扱い上の注意

火気を避けて保存すること。

22. 包装

| 規格 | 調剤包装単位コード | 販売包装単位コード |
|-------------|--------------------|--------------------|
| 80mL×10 | (01)04987288115045 | (01)14987288115264 |
| 500mL(減容ポリ) | (01)04987288115038 | (01)14987288115257 |
| 1L(減容ポリ) | (01)04987288115052 | (01)14987288115301 |
| 10L | (01)04987288115069 | (01)14987288115547 |

■詳細は電子添文をご参照ください。
■電子添文の改訂に十分ご注意ください。



ヨシダ製薬

製造販売元
吉田製薬株式会社
埼玉県狭山市南入曾951

吉田製薬 製品情報

文献請求先及び問い合わせ先

吉田製薬株式会社 ②2404CL
東京都中野区中央5-1-10 400062
Tel:03-3381-2004 2024年4月改訂