



1% クロルヘキシジンエタノールを
含浸させた綿棒です!

ヘキサック® AL 1%綿棒12

Hexizac AL 1% Cotton Stick 12 ● 1%クロルヘキシジンエタノール含浸綿棒
(1本入り×50、2本入り×50)

血管内留置カテーテル関連感染予防のためのCDCガイドライン
(2011年)において、皮膚消毒は0.5%を超える(>0.5%)濃度
のクロルヘキシジンアルコールが推奨されました。

透析施設における標準的な透析操作と感染予防に関するガイドライン
(四訂版)(2015年)において、バスキュラーアクセスの消毒に適した
製剤の一つとして0.5%を超える濃度のクロルヘキシジングルコン酸
塩含有アルコールが推奨されました。(エビデンスレベル: Level 1A)



83vol%エタノール含有

実物大

(写真は1本入り×50)

アルコール過敏症の方に

アルコールを含まない
1% クロルヘキシジンを含浸させた綿棒です!

滅菌製剤

ヘキサック® 水溶液1%綿棒12

Hexizac Solution 1% Cotton Stick 12 ● 1%クロルヘキシジン水溶液含浸綿棒
(1本入り×50)



1%
CHG水

実物大

【禁忌(次の患者及び部位には使用しないこと)】

1. クロルヘキシジン製剤に対し過敏症の既往歴のある患者
2. 脳、脊髄、耳(内耳、中耳、外耳)
〔聴神経及び中枢神経に対して直接使用した場合は、難聴、神経障害を来すことがある。〕
3. 腔、膀胱、口腔等の粘膜面〔クロルヘキシジン製剤の左記部位への使用により、ショック、アナフィラキシーの
症状の発現が報告されている。〕
4. 損傷皮膚及び粘膜(ヘキサックAL1%綿棒12)
〔エタノールを含有するので、損傷皮膚及び粘膜への使用により、刺激作用を有する。〕
5. 眼



ヨシダ製薬

特徴

- 殺菌作用は迅速かつ持続性があります
- クロルヘキシジンを吸着しにくい素材を使用しています
- 速乾性です(ヘキサック®AL1%綿棒12)
- 1%クロルヘキシジン水溶液が含浸された製剤です(アルコールを含みません)(ヘキサック®水溶液1%綿棒12)

有効性
各種細菌・真菌に対する殺菌効果

● ヘキサック®AL1%綿棒12¹⁾(浮遊試験法)

供試菌株		殺菌時間
グラム陽性菌	<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538	30秒以内
	<i>Staphylococcus aureus</i> (MRSA) CI	30秒以内
	<i>Staphylococcus epidermidis</i> JCM 2414	30秒以内
	<i>Enterococcus faecalis</i> JCM 5803	30秒以内

CI:臨床分離株

● ヘキサック®水溶液1%綿棒12²⁾(キャリアー試験変法)

供試菌株		殺菌時間
グラム陽性菌	<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538	30秒以内
	<i>Staphylococcus aureus</i> (MRSA) CI	30秒以内
	<i>Staphylococcus epidermidis</i> JCM 2414	30秒以内

CI:臨床分離株

供試菌株		殺菌時間
グラム陰性菌	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 15442	30秒以内
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> CI	30秒以内
	<i>Escherichia coli</i> ATCC 10536	30秒以内
	<i>Serratia marcescens</i> JCM 1239	30秒以内
真菌(酵母)	<i>Candida albicans</i> ATCC 10231	30秒以内

1) 社内資料:ヘキサック®AL1%綿棒12の殺菌効果および抗菌効果

供試菌株		殺菌時間
グラム陰性菌	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 15442	1分以内
	<i>Serratia marcescens</i> JCM 1239	30秒以内
真菌(酵母)	<i>Candida albicans</i> ATCC 10231	1分以内

2) 社内資料:ヘキサック®水溶液1%綿棒12の殺菌効果および抗菌効果

外用殺菌消毒剤

薬価基準未収載

ヘキサック®AL1%綿棒12

Hexicac AL 1% Cotton Stick 12 ●1%v/vクロルヘキシジンエタノール含浸綿棒

滅菌製剤

ヘキサック®水溶液1%綿棒12

Hexicac Solution 1% Cotton Stick 12 ●1%v/vクロルヘキシジン水溶液含浸綿棒



手指・皮膚



火気厳禁

貯法:ヘキサックAL1%綿棒12:遮光した気密容器に入れ、火気を避けて保存

ヘキサック水溶液1%綿棒12:遮光した気密容器

使用期限:ヘキサックAL1%綿棒12:2年(箱に記載)、ヘキサック水溶液1%綿棒12:3年(箱に記載)

	ヘキサックAL1%綿棒12	ヘキサック水溶液1%綿棒12
日本標準商品分類番号	872619	
承認番号	22100AMX02247000	22900AMX00109000
薬価収載	薬価基準未収載	
販売開始年月	2010年2月	2017年5月
再評価結果年月	1992年6月	

- (3)本剤が眼に入らないように注意すること。眼に入った場合は直ちによく水洗すること。
- (4)広範囲または長期間使用の場合には、蒸気の吸入に注意すること。(エタノール蒸気は大量にまたは繰り返しさらされた場合、粘膜への刺激、頭痛等を起こすことがある。)(ヘキサックAL1%綿棒12)

- 3. 副作用
本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

- ※(1)重大な副作用
ショック(0.1%未満)、アナフィラキシー(頻度不明):ショック、アナフィラキシーがあらわれることがあるので観察を十分に行い、血圧低下、尋麻疹、呼吸困難等があらわれた場合は、直ちに使用を中止し、適切な処置を行うこと。

- (2)その他の副作用
過敏症^{※1)}(0.1%未満):発疹、尋麻疹等
皮膚^{※2)}(5%以上又は頻度不明):刺激症状(ヘキサックAL1%綿棒12)
注1)このような症状があらわれた場合には、直ちに使用を中止し再使用しないこと。
注2)このような症状があらわれた場合には、使用を中止すること。

- 4. 適用上の注意
(1)投与経路:外用にのみ使用すること。
(2)使用時
1)石けん類は本剤の殺菌作用を減弱させるので、予備洗浄に用いた石けん分を十分に洗い落とししてから使用すること。
2)同一部位(皮膚面)に反復使用した場合には、脱脂等による皮膚荒れを起こすことがあるので注意すること。(ヘキサックAL1%綿棒12)
3)血清、膿汁等の有機性物質は殺菌作用を減弱させるので、十分注意すること。(ヘキサックAL1%綿棒12)
4)血清、膿汁等の有機性物質は殺菌作用を減弱させるので、これらが付着している場合は十分に洗い落とししてから使用すること。(ヘキサック水溶液1%綿棒12)
5)本剤はエタノールを含有するので、火気に注意すること。(ヘキサックAL1%綿棒12)
- 5. その他の注意
クロルヘキシジングルコン酸塩製剤の投与により、ショック症状を起こした患者のうち、数例について、血清中にクロルヘキシジンに特異的なIgE抗体が検出されたとの報告がある。

【禁忌(次の患者及び部位には使用しないこと)】

1. クロルヘキシジン製剤に対し過敏症の既往歴のある患者
2. 脳、脊髄、耳(内耳、中耳、外耳)[聴神経及び中枢神経に対して直接使用した場合は、難聴、神経障害を来すことがある。]
- ※ 3. 腔、膀胱、口腔等の粘膜面[クロルヘキシジン製剤の左記部位への使用により、ショック、アナフィラキシーの症状の発現が報告されている。]
4. 損傷皮膚及び粘膜(ヘキサックAL1%綿棒12)[エタノールを含有するので、損傷皮膚及び粘膜への使用により、刺激作用を有する。]
5. 眼

組成・性状

1. 組成
ヘキサックAL1%綿棒12:成分・含量:本溶液100mL中、日局クロルヘキシジングルコン酸塩液5mL(クロルヘキシジングルコン酸塩として1g)を含有する。添加物としてエタノール、pH調整剤を含有する。担体:綿棒(薬液量:綿棒1本あたり本溶液2mL)
ヘキサック水溶液1%綿棒12:成分・含量:本溶液100mL中、日局クロルヘキシジングルコン酸塩液5mL(クロルヘキシジングルコン酸塩として1g)を含有する。添加物としてラウロマクロゴール、赤色2号を含有する。担体:綿棒(含浸量:綿棒1本あたり本溶液2.5mL)
2. 製剤の性状
ヘキサックAL1%綿棒12:本剤に含浸している液は、無色澄明の液で、特異なにおいがある。
ヘキサック水溶液1%綿棒12:本剤に含浸している液は、淡赤色～赤色の液である。

効能・効果

手指・皮膚の消毒

用法・用量

手指・皮膚の消毒には、洗浄後、1日数回適量を塗布する。

使用上の注意

1. 慎重投与(次の患者には慎重に使用すること)
(1)薬物過敏症の既往歴のある患者
(2)喘息等のアレルギー疾患の既往歴、家族歴のある患者
2. 重要な基本的注意
※(1)ショック、アナフィラキシー等の反応を予測するため、使用に際してはクロルヘキシジン製剤に対する過敏症の既往歴、薬物過敏体質の有無について十分な問診を行うこと。
(2)産婦人科用(腔・外陰部の消毒等)、泌尿器科用(膀胱・外性器の消毒等)には使用しないこと。

取扱い上の注意

1. 本剤の付着した白布を直接次亜塩素酸塩で漂白すると、褐色のシミを生ずることがあるので、漂白剤としては、過炭酸ナトリウム等の酸素系の漂白剤が適当である。
2. 開封後は速やかに使用すること。
3. 安定性試験
最終包装製品を用いた加速試験(40℃、相対湿度75%、6ヵ月)の結果、外観及び含量等は規格の範囲内であり、ヘキサック水溶液1%綿棒12は通常の市場の流通下において3年間安定であることが推測された。(ヘキサック水溶液1%綿棒12)

包装

ヘキサックAL1%綿棒12:1本入り×50、2本入り×50 ヘキサック水溶液1%綿棒12:1本入り×50

- 効能・効果、用法・用量、禁忌、使用上の注意等の改訂にご留意ください。
- 詳細は製品添付文書をご参照ください。



ヨシダ製薬

製造販売元
吉田製薬株式会社
埼玉県狭山市南入曽951

資料請求先

吉田製薬株式会社
東京都中野区中央5-1-10
Tel:03-3381-2004

©1803IS
400145
2018年3月改訂