

外皮用殺菌消毒剤

第3類医薬品

プッシュ綿棒P

10%ポビドンヨード液+綿棒



No.13
薬液量 5.0mL

No.12
薬液量 1.5mL



吉田製薬株式会社

特 長

プッシュ綿棒Pは綿棒と外皮用殺菌消毒剤である10%ポビドンヨード液を別ポケットにて包装した製品です。使用前に綿棒を薬液ポケットに“プッシュ”することにより10%ポビドンヨード液を含ませ、使用できます。

衛生的 個包装で使い切りタイプです。


綿棒の軸部分に10%ポビドンヨード液がつきません。

消毒に適した薬液量 1回分が包装されており無駄がありません。


携帯に便利 個包装ですので携帯に適しております。

綿棒の取扱い方法


以下のようにして薬液を含浸させて、開封してください。薬液と綿棒が見える向きに持ち、綿棒を押込んでください。




1 綿棒を両手で押さえるように持つ



2 綿棒を薬液側に押込む



3 フィルムを左右に剥がす



4 綿棒を取出す



5 消毒部分の内側から外側へ円を描くように塗布する



外皮用殺菌消毒剤 第3類医薬品

プッシュ綿棒P

10%ポビドンヨード液+綿棒

効能・効果、用法・用量、使用上の注意等の改訂にご留意ください。 使用期限：2年(包装等に記載)

区分	一般用医薬品
日本標準商品分類番号	872612
承認番号	21700APZ01119000
販売開始	2011年4月

成分及び分量

プッシュ綿棒Pの薬液は、1mL中に下記の成分を含有する。

有効成分	日局ポビドンヨード	100mg(有効ヨウ素10mg)
添加物	ラウロマクロゴール、リン酸水素ナトリウム、クエン酸	

使用上の注意

☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

次の人は使用しないこと

●本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

☒ 相談すること

1.次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

●医師の治療を受けている人。

●薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

●患部が広範囲の人。

●深い傷やひどいやけどの人。

2.使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品等を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称

ショック
(アナフィラキシー)

症 状

使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

3.5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

効能・効果

切り傷、さし傷、すりむき傷、靴ずれ、やけどなどの患部の殺菌・消毒。とびひ、おでけなどの感染皮膚面の殺菌・消毒

用法・用量

1日数回患部に塗布すること。〈用法及び用量に関連する注意〉

- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用せること。
- 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合は、眼科医の診療を受けること。
- 本剤は外用にのみ使用し、内服、うがいや粘膜の殺菌・消毒には使用しないこと。

保管及び取り扱い上の注意

- 直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。
- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる)。
- 衣服等に付着すると着色するので注意すること。なお付着した場合にはすぐに水でよく洗い落とすこと。
- 開封後はすみやかに使用すること。

2013年3月改訂

包装規格

品 名	サイズ 縦×横×高(mm)	重量・総重量	梱包入数	JANコード
No.12 プッシュ綿棒P 1本入り×24	個装 100×90×250 外装 520×270×385 (1包 245×31×15)	197.5g 4.7kg (1包 5g)	20	
	個装 125×100×250 外装 655×270×425 (1包 245×40×20)	326g 7.5kg (1包 9g)		

発売元
 YOSHIDA

吉田製薬株式会社
東京都中野区中央5-1-10
【製品情報サイト】<http://www.yoshida-pharm.jp/>

製造販売元
 HAKUZO

ハクゾウメディカル株式会社
大阪市中央区徳井町2丁目4番9号

お問い合わせ先

吉田製薬株式会社
東京都中野区中央5-1-10
Tel: 03-3381-2004
受付時間9:00~17:00
(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度の問合せ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai/camp/index.html>
☎ 0120-149-931(フリーダイヤル)

③1709OP
400112
2017年9月作成