




外皮消毒剤 指定医薬部外品

ポピコットン棒


10%ポビドンヨード液含浸綿棒

1本入り×30

綿棒の取り出し方



!
綿棒をアルミの上
から押さえていると
切れません



1 切り口の矢印に
沿ってアルミを
切る



2 残ったアルミを
切り口の矢印に
沿って切る



3 アルミの上から
綿棒をつまんで
取り出す



製造販売元
吉田製薬株式会社
埼玉県狭山市南入曽951

外皮消毒剤 指定医薬部外品

ポピコットン棒

10%ポビドンヨード液含浸綿棒

1本入り×30

【使用上の注意】

☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

次の人は使用しないこと

- (1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2)患部が広範囲の人。
- (3)深い傷やひどいやけどの人。

相談すること

1.次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1)医師の治療を受けている人。
- (2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2.使用後、次の症状があらわれた場合は、副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。
その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症状
ショック(アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

3.5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能・効果】

すり傷、切り傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の洗浄・消毒

外皮消毒剤 指定医薬部外品

ポピコットン棒

10%ポビドンヨード液含浸綿棒

1本入り×30



【用法・用量】

1日数回患部に塗布する。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用せること。
- (2)目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。
なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。
- (3)外用にのみ使用すること。

【成分・分量】

1包中

日本薬局方ポビドンヨード0.25g

綿棒1本

添加物としてラウロマクロゴール、グリセリン、乳酸ナトリウム、ヨウ化ナトリウム、pH調整剤を含む
(10%ポビドンヨード液2.5mLを含む)

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。
- (2)小児の手の届かない所に保管すること。
- (3)他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わること。)
- (4)開封後はすみやかに使用すること。

お問い合わせ先

吉田製薬株式会社 お客様相談室

東京都中野区中央5-1-10

TEL.03-3381-2004

受付時間: 9:00~17:00

(土、日、祝日を除く)



製造
番号
使用
期限

10%ポビドンヨード液含浸錠棒

ポピコットン棒

外皮消毒剤 指定医薬部外品

1本入り×30

←開き口




外皮消毒剤 指定医薬部外品

ポピコットン棒

10%ポビドンヨード液含浸錠棒

1本入り×30

錠棒の取り出し方



錠棒をアルミの上から押さえていると切れません

- 1 切り口の矢印に沿ってアルミを切る
- 2 残ったアルミを切り口の矢印に沿って切る
- 3 アルミの上から錠棒をつまんで取り出す

YOSHIDA ヨシダ製薬
製造販売元 吉田製薬株式会社
埼玉県狭山市南入曽951

外皮消毒剤 指定医薬部外品

ポピコットン棒

10%ポビドンヨード液含浸錠棒

1本入り×30

【使用上の注意】

- 【してはいけないこと】**
(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
次の人は使用しないこと
(1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしきことがある人。
(2)患部が広範囲の人。
(3)深い傷やひどいやけどの人。

【相談すること】

- 1.次の人には使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
(1)医師の治療を受けている人。
(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2.使用後、次の症状があらわれた場合は、副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤・かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。
その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症状
ショック(アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

3.5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能・効果】
すり傷、切り傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の洗浄・消毒

外皮消毒剤 指定医薬部外品

ポピコットン棒

10%ポビドンヨード液含浸錠棒

1本入り×30

錠棒の取り出し方は
裏面を参照してください

錠棒をアルミの上から
押さえていると切れません

YOSHIDA ヨシダ製薬
製造販売元 吉田製薬株式会社
埼玉県狭山市南入曽951

外皮消毒剤 指定医薬部外品

ポピコットン棒

10%ポビドンヨード液含浸錠棒

1本入り×30

←開き口 開き口→

【用法・用量】

1日数回患部に塗布する。

【用法・用量に関する注意】

- (1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとで使用されること。
(2)目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。
なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。
(3)外用にのみ使用すること。

【成分・分量】

1包中

日本薬局方ポビドンヨード0.25g

錠棒1本

添加物としてラウロマクロゴール、グリセリン、乳酸ナトリウム、ヨウ化ナトリウム、pH調整剤を含む
(10%ポビドンヨード液2.5mLを含む)

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。
(2)小児の手の届かない所に保管すること。
(3)他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
(4)開封後はすみやかに使用すること。

お問い合わせ先
吉田製薬株式会社 お客様相談室
東京都中野区中央5-1-10
TEL.03-3381-2004
受付時間:9:00~17:00
(土、日、祝日を除く)

987288002048

製造番号
使用期限

