

2012年4月改訂(記載要領変更に伴う改訂等)

【使用上の注意】△

【因してはいけないこと】

【守らないと現在の症状が悪化したり副作用が
起こりやすくなる】

1. 軽く塗るだけにとどめ、ガーゼ、脱脂綿等に浸して患部に貼付しないこと。2. 次の部位には使用しないこと。目の周り、口唇等の粘膜の部分(局所刺激作用があるため。)

■相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

(1) 医師の治療を受けている人 (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (3) 患部が広範囲の人 (4) 深い傷やひどいやけどの人

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品をもって医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ等

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

【効能・効果】創傷面の殺菌・消毒

【用法・用量】本液を脱脂綿、ガーゼ等に浸して患部に軽く塗る。

外皮用殺菌消毒剤

日本薬局方

第3類医薬品

消毒用エタノール

Ethanol for Disinfection

消毒用エタノール「コザカイ・P」

50mL



ヨシダ製薬

発売元

吉田製薬株式会社
東京都中野区中央5-1-10

製造販売元 小堺製薬株式会社

東京都墨田区両国4-36-9

RD

〈用法・用量に関する注意〉

(1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもと使用されること。(2) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い流すこと。なお、症状が重い場合には、直ちに眼科医の診療を受けること。(3) 外用にのみ使用し、内服しないこと。(4) 定められた用法を厳守すること。(5) 同一部位にくり返し使用した場合には、脱脂等による皮ふ荒れを起こすことがあるので注意すること。(6) 長期間または広範囲に使用する場合には、蒸気の吸入に注意すること。

【成 分】本品はエタノール(C_2H_5OH :46.07)76.9~81.4vol%を含有する。

【保管及び取扱い上の注意】(1) 直射日光の当たらぬ涼しい所に密栓して保管すること。(2) 小児の手の届かない所に保管すること。(3) 他の容器に入れかえないこと。(誤用の原因になつたり品質が変わるものがある。)(4) 火気に近づけないこと。(5) 本液はニスを溶かすので、ニスの塗ってある建具や家具等には本液が付着しないように注意すること。(6) 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。

火気厳禁 アルコール類 危険等級Ⅱ 水溶性

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

〈吉田製薬お客様相談室〉

電話:03-3381-2004

受付時間:9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

使用期限

製造番号



キャップ: PP



ガラス: 瓶

1 2 0 1 0 0

8 8 7 2 8 8

4 9 8 7 2 8

4