

## 製品特長

プッシュ綿棒Pは綿棒と外皮用殺菌消毒剤である10%ポビドンヨード液を別ポケットにて包装した製品です。使用前に綿棒を薬液ポケットに“プッシュ”することにより10%ポビドンヨード液を含ませ、使用できます。

### 衛生的

個包装で使い切りタイプです。  
綿棒の軸部分に10%ポビドンヨード液がつきません。

### 消毒に適した薬液量

1回分が包装されており無駄がありません。

### 携帯に便利


個包装ですので携帯に適しております。

薬液量 No.13 1本入り×24  
5.0mL



## 綿棒の取り出し方

以下のようにして薬液を含浸させて、開封してください。  
薬液と綿棒が見える向きに持ち、綿棒を押込んでください。



薬液量 No.13 1本入り×24  
5.0mL

第3類医薬品

外皮用殺菌消毒剤  
プッシュ綿棒P  
10%ポビドンヨード液＋綿棒

### 【成分及び分量】

プッシュ綿棒Pの薬液は、1mL中に下記の成分を含有する。

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 有効成分 | 日局ポビドンヨード100mg(有効ヨウ素10mg) |
| 添加物  | ラウロマクロゴール、リン酸水素ナトリウム、クエン酸 |

### 【保管及び取扱い上の注意】

使用期限 2年(包装等に記載)

- 直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。
- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)。
- 衣服等に付着すると着色するので注意すること。なお付着した場合にはすぐに水でよく洗い落とすこと。
- 開封後はすみやかに使用すること。

ご使用に際して、箱の記載を必ずお読みください。

### お問い合わせ先

吉田製薬株式会社 お客様相談室  
東京都中野区中央5-1-10  
TEL.03-3381-2004  
受付時間9:00～17:00(土、日、祝日を除く)  
副作用被害救済制度の問合せ先  
(独)医薬品医療機器総合機構  
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>  
☎ 0120-149-931(フリーダイヤル)

発売元  
**吉田製薬株式会社**  
東京都中野区中央5-1-10  
製造販売元  
**ハクゾウメディカル株式会社**  
大阪市中央区徳井町2丁目4番9号



4 987288 950028

小箱  
中仕切

第3類医薬品

外皮用殺菌消毒剤

プッシュ綿棒P

10%ポビドンヨード液＋綿棒

薬液量 No.13 1本入り×24  
5.0mL



綿棒の取り出し方は  
裏面を参照してください

発売元  
**吉田製薬株式会社**  
東京都中野区中央5-1-10  
製造販売元  
**ハクゾウメディカル株式会社**  
大阪市中央区徳井町2丁目4番9号

## ⚠ 使用上の注意

### ⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

次の人は使用しないこと。

- 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。



### 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

- 医師の治療を受けている人。
- 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 患部が広範囲の人。
- 深い傷やひどいやけどの人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

| 関係部位 | 症 状       |
|------|-----------|
| 皮 膚  | 発疹・発赤、かゆみ |

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

| 症状の名称              | 症 状                                                        |
|--------------------|------------------------------------------------------------|
| ショック<br>(アナフィラキシー) | 使用後すぐに、皮膚のかゆみじんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。 |

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

### 【効能又は効果】

切り傷、さし傷、すりむき傷、靴ずれ、やけどなどの患部の殺菌・消毒。  
とびひ、おでこなどの感染皮膚面の殺菌・消毒

### 【用法及び用量】

1日数回患部に塗布すること。

〈用法及び用量に関連する注意〉

- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。  
なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。
- 本剤は外用にのみ使用し、内服、うがいや粘膜の殺菌・消毒には使用しないこと。

薬液量 5.0mL  
No.13  
1本入り×24

10%ポビドンヨード液+綿棒

プッシュ綿棒P

外用殺菌消毒剤

第3類医薬品

## 製品特長

プッシュ綿棒Pは綿棒と外用殺菌消毒剤である10%ポビドンヨード液を別ポケットにて包装した製品です。使用前に綿棒を薬液ポケットに“プッシュ”することにより10%ポビドンヨード液を含ませ、使用できます。

### 衛生的

個包装で使い切りタイプです。

綿棒の軸部分に10%ポビドンヨード液がつきません。

### 消毒に適した薬液量

1回分が包装されており無駄がありません。

### 携帯に便利


個包装ですので携帯に適しております。

薬液量 5.0mL No.13  
1本入り×24




## 綿棒の取り出し方


以下のようにして薬液を含浸させて、開封してください。  
薬液と綿棒が見える向きに持ち、綿棒を押し込んでください。




1 綿棒を両手で  
押さえるように持つ



2 綿棒を薬液側に  
押込む



3 フィルムを  
左右に剥がす



4 綿棒を取り出す

薬液量 5.0mL  
No.13  
1本入り×24

第3類医薬品

外用殺菌消毒剤

プッシュ綿棒P

10%ポビドンヨード液+綿棒

### 【成分及び分量】

プッシュ綿棒Pの薬液は、1mL中に下記の成分を含有する。

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 有効成分 | 日局ポビドンヨード100mg（有効ヨウ素10mg） |
| 添加物  | ラウロマクロゴール、リン酸水素ナトリウム、クエン酸 |

### 【保管及び取扱い上の注意】

使用期限 2年（包装等に記載）

●直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。

●小児の手の届かない所に保管すること。

●他の容器に入れ替えないこと（誤用の原因になったり品質が変わる）。

●衣服等に付着すると着色するので注意すること。なお付着した場合にはすぐに水でよく洗い落とすこと。

●開封後はすみやかに使用すること。

ご使用に際して、箱の記載を必ずお読みください。

### お問い合わせ先

吉田製薬株式会社 お客様相談室

東京都中野区中央5-1-10

TEL.03-3381-2004

受付時間9:00～17:00（土、日、祝日を除く）

副作用被害救済制度の問合せ先

（独）医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

☎ 0120-149-931（フリーダイヤル）

外用殺菌消毒剤

プッシュ綿棒P

10%ポビドンヨード液+綿棒

薬液量 5.0mL  
No.13  
1本入り×24

綿棒の取り出し方は  
裏面を参照してください

## ⚠ 使用上の注意

### ❌ してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる）

次の人は使用しないこと。

- 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。



### ■ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

- 医師の治療を受けている人。
- 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 患部が広範囲の人。
- 深い傷やひどいやけどの人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

| 関係部位 | 症 状       |
|------|-----------|
| 皮 膚  | 発疹・発赤、かゆみ |

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

| 症状の名称              | 症 状                                                                |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|
| ショック<br>（アナフィラキシー） | 使用後すぐに、皮膚のかゆみじんましん、<br>声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦<br>しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。 |

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

### 【効能又は効果】

切り傷、さし傷、すりむき傷、靴ずれ、やけどなどの患部の殺菌・消毒。  
とびひ、おできなどの感染皮膚面の殺菌・消毒

### 【用法及び用量】

1日数回患部に塗布すること。

＜用法及び用量に関連する注意＞

- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。  
なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。
- 本剤は外用にのみ使用し、内服、うがいや粘膜の殺菌・消毒には使用しないこと。

発売元  
吉田製薬株式会社  
東京都中野区中央5-1-10

製造販売元  
ハクゾウメディカル株式会社  
大阪市中央区徳井町2丁目4番9号



紙 小箱  
中仕切

発売元  
吉田製薬株式会社  
東京都中野区中央5-1-10

製造販売元  
ハクゾウメディカル株式会社  
大阪市中央区徳井町2丁目4番9号