

【使用上の注意】

してはいけないこと

- (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
次の部位には使用しないこと
(1) 損傷のある皮膚。
(2) 目の周囲、粘膜等。

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤・かゆみ

【他の注意】

本剤の使用によりアレルギーテストの検査に影響を及ぼすことがある

【成分】

1袋中

日本薬局方エタノール 56.1mL
医療脱脂綿 15g (4cm×4cm 50枚)
添加物として日局ユカリ油を微量含む
(76.9～81.4vol%エタノール67.6mLを含む)

【効能・効果】

手指・皮膚の消毒、医療機器の消毒

【用法・用量】

そのまま塗擦、清浄用として用いる
(用法・用量に閑連する注意)

1. 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用されること。

2. 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。
なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。

3. 外用にのみ使用すること。

4. 過度に使用すると、脱脂等による皮膚荒れを起こすことがある。

5. 広範囲又は長時間使用する場合には、蒸気の吸入に注意すること。

6. アルコール分がタンパク質を凝固させ、内部にまで浸透しないことがあるので、医療器具等を清拭する際は血清膿汁等を十分に洗い落としてから使用すること。

【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。
- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる。)。
- 火気に近づけないこと。
- 綿の表面あるいは内部に黄色又は黒色の斑点状のものが見られることがあるが、天然の種子の一部であるので、使用上の問題はない。
- 使用後はトイレに流さないで、衛生的に処理すること。
- 開封後はすみやかに使用すること。
- アルコール又は他の薬剤を注入して使用しないこと。また、脱脂綿を継ぎ足して使用しないこと。

お問い合わせ先

吉田製薬株式会社 お客様相談室

東京都中野区中央5-1-10

TEL.03-3381-2004

受付時間9:00～17:00

(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度の問合せ先

(独)医薬品医療機器総合機構

http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html

☎ 0120-149-931(フリーダイヤル)

消毒綿

第3類医薬品

エコ消エタ綿P

76.9～81.4vol% エタノール含浸綿

【効能・効果】

手指・皮膚の消毒

医療機器の消毒

火気厳禁

4cm×4cm 50枚



アルミパック

10個入

消毒綿

◀ 開封口

2018年5月改訂

第3類医薬品

エコ消エタ綿P[®]

76.9~81.4vol% エタノール含浸綿

【機能・効果】
手指・皮膚の消毒
医療機器の消毒


火気厳禁

4cm×4cm 50枚



ヨシダ"製薬"

製造販売元
吉田製薬株式会社
埼玉県狭山市南入曽951



アルミパック

10個入

消毒綿


第3類医薬品

エコ消エタ綿P[®]

76.9~81.4vol% エタノール含浸綿

4cm×4cm 50枚

火気厳禁



アルミパック

10個入



4 987288 010258

製造番号

使用期限

