

—医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読み下さい。—

## 効能追加および使用上の注意改訂のお知らせ

2018年6月  
吉田製薬株式会社  
東京都中野区中央5-1-10

殺菌消毒薬

第2類医薬品

# ジクロシア 2.5g 錠

ジクロロイソシアヌール酸ナトリウム製剤

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度、標記製品について、「医療器具の消毒、器具・物品などの消毒、室内・便所・浴室の消毒」の効能・効果、用法・用量が追加承認されました。また、使用上の注意についても改訂を致しましたのでご案内申し上げます。

なお、改訂後の内容が記載された製品がお手元に届くまでには若干の日数を要しますので、今後のご使用に際しましては、本内容をご参照下さいますようお願い申し上げます。

謹白

—記—

改訂内容（下線\_\_\_\_\_部追記）

### 1. 効能・効果、用法・用量

改訂後（新）（下線_____部追記）		改訂前（旧）	
効能・効果	用法・用量	効能・効果	用法・用量
哺乳びん・乳首の消毒 殺菌	水 10 L 当たり本品 1 錠 を溶かした液に 1 時間 以上浸す。	哺乳びん・乳首の消毒 殺菌	水 10 L 当たり本品 1 錠 を溶かした液に 1 時間 以上浸す。
<u>医療器具の消毒</u>	<u>水 5 L 当たり本品 1 ～ 2 錠を溶かした液に数 分間浸すか、清拭す る。</u>		
<u>器具・物品などの消毒</u>	<u>水 5 L 当たり本品 1 ～ 2 錠を溶かした液に数 分間浸すか、清拭す る。</u>		
<u>室内・便所・浴室の消毒</u>	<u>水 5 L 当たり本品 1 ～ 2 錠を溶かした液で清 拭する。</u>		

## 2. 使用上の注意

1) 相談すること：変更なし (略)

### 2) 用法・用量に関連する注意

改訂後（新）（下線_____部追記）	改訂前（旧）
<p>1. 定められた用法・用量を厳守してください。</p> <p><u>2. 換気の良い場所で使用してください。</u></p> <p>3. 液体タイプの塩素系洗浄・漂白剤、酸性の洗浄・漂白剤等との混合は危険ですので避けてください。</p> <p>4. 金属製の容器は用いないでください。また、哺乳びんバサミ、スプーン等の金属製品や、指輪等貴金属を本品の溶液につけることも避けてください。メラニン食器等には、本品の使用を避けてください。</p> <p>5. 調製後、本品の溶液が変色した場合、その水での調製を避けてください。</p>	<p>1. 定められた用法・用量を厳守してください。</p> <p>2. 液体タイプの塩素系洗浄・漂白剤、酸性の洗浄・漂白剤等との混合は危険ですので避けてください。</p> <p>3. 金属製の容器は用いないでください。また、哺乳びんバサミ、スプーン等の金属製品や、指輪等貴金属を本品の溶液につけることも避けてください。メラニン食器等には、本品の使用を避けてください。</p> <p>4. 調製後、本品の溶液が変色した場合、その水での調製を避けてください。</p>

### 3) 保管及び取扱い上の注意

改訂後（新）（下線_____部追記）	改訂前（旧）
<p>1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。</p> <p><u>2. 小児の手の届かないところに保管してください。</u></p> <p>3. 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わる）</p> <p>4. 衣類等につくと脱色、変色することがありますので注意してください。</p> <p>5. 殺菌消毒する製品によっては印刷面（文字、絵）、材質など変色・変質することがあります。</p>	<p>1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。</p> <p>2. 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わる）</p> <p>3. 衣類等につくと脱色、変色することがありますので注意してください。</p> <p>4. 殺菌消毒する製品によっては印刷面（文字、絵）、材質など変色・変質することがあります。</p>

発売元  **吉田製薬株式会社**  
東京都中野区中央5-1-10

製造販売元  **日産化学工業株式会社**  
東京都千代田区神田錦町三丁目7番地1