

—医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読み下さい。—

## 使用上の注意改訂のお知らせ

2026年1月  
吉田製薬株式会社  
東京都中野区中央5-1-10

解熱鎮痛消炎剤・川崎病用剤  
日本薬局方 アスピリン

### アスピリン「ヨシダ」

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。  
さて、この度標記製品につきまして、厚生労働省医薬局医薬安全対策課長通知（令和8年1月13日付 医薬安発0113第4号）及び自主改訂により使用上の注意の改訂を致しましたのでお知らせ申し上げます。  
今後のご使用に際しましては、下記内容をご参照くださいますようお願い申し上げます。

謹白

一記一

#### 1. 改訂内容

通知による追記：\_\_\_\_\_部、自主改訂による追記：\_\_\_\_\_

改訂後	改訂前
<p>11. 副作用 (略)</p> <p>11.1 重大な副作用</p> <p>11.1.1 ショック、アナフィラキシー（いずれも頻度不明） ショックやアナフィラキシー（呼吸困難、全身潮紅、血管性浮腫、蕁麻疹等）があらわれることがある。</p> <p>11.1.2～11.1.7 (略)</p> <p>11.1.8 アレルギー反応に伴う急性冠症候群（頻度不明）</p>	<p>11. 副作用 (略)</p> <p>11.1 重大な副作用</p> <p>11.1.1 ショック、アナフィラキシー（いずれも頻度不明） ショックやアナフィラキシー（呼吸困難、全身潮紅、血管浮腫、蕁麻疹等）があらわれることがある。</p> <p>11.1.2～11.1.7 (略)</p> <p>←追記</p>

#### 2. 改訂理由

##### ・厚生労働省医薬局医薬安全対策課長通知による追記

当局において、アレルギー反応に伴う急性冠症候群関連症例が評価されました。症例の因果関係評価及び使用上の注意の改訂要否について、専門委員の意見も聴取した結果、アスピリン含有剤とアレルギー反応に伴う急性冠症候群との因果関係が否定できない症例が集積したことから、使用上の注意を改訂することが適切と判断され、改訂に至りました。

##### ・自主改訂 用語の変更

関連学会のガイドライン等では「血管性浮腫」の用語が使用されていることを踏まえ、「血管浮腫」を「血管性浮腫」に変更しました。

今回の【使用上の注意】の改訂内容については、医薬品安全対策情報(DSU) No.342(2026年2月)に掲載予定です。  
2025年3月の「使用上の注意等」改訂時の情報提供方法の変更についてによるお知らせのとおり、2025年4月よりPMDA メディナビをもって情報提供を実施することに致しました。何卒、ご理解ご了承の程よろしくお願い申し上げます。

改訂後の電子添文は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構ホームページ(<https://www.pmda.go.jp/>)又は吉田製薬株式会社ホームページの製品情報サイト(<https://www.yoshida-pharm.co.jp/product/>)をご覧ください。  
なお、以下のGS1バーコードを添付文書閲覧アプリ「添文ナビ®」で読み取ることで、本製品の最新の電子添文等をご覧いただけます。

アスピリン「ヨシダ」  
100g



(01) 14987288300202

製造販売元



吉田製薬株式会社  
埼玉県狭山市南入曽951

以上