

付録B 適用部位早見表

水 準	消 毒 薬 (主 成 分)	消 毒 適 用 部 位															
		人 体											医 療 機 器		環 境		排 泄 物
		手 指 ・ 皮 膚	手 術 部 位 (手 術 野) の 皮 膚	手 術 部 位 (手 術 野) の 粘 膜	皮 膚 の 創 傷 部 位	粘 膜 の 創 傷 部 位	感 染 皮 膚 面	熱 傷 皮 膚 面	腔	外 陰 ・ 外 性 器 皮 膚	結 膜 囊	耳 鼻 咽 喉 (口 腔 粘 膜)	歯 根 管 領 域	金 属	非 金 属	室 内 ・ 手 術 室	
高	過酢酸	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×
	グルタラル	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×
	フタラル	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×
中	次亜塩素酸ナトリウム	▲	▲	▲								○ <sup>1)</sup>	▲	○	○	○	○
	ポビドンヨード	○	○	○	○	○	○	○ <sup>2)</sup>	○ <sup>2)</sup>		○ <sup>3)</sup>						×
	ヨードチンキ	○		×	△	×	×	×	×	×	△ <sup>3)</sup>	○					×
	エタノール	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×		○	△			×
	イソプロパノール	○		×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	△			×
	イソプロパノール添加エタノール液	○		×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	△			×
	1w/v%クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール液	○	◆	×	×	×	×	×	×	×	×	×					×
	0.5w/v%クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール液		○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	△			×
	1w/v%・0.5w/v%クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール擦式製剤	○ <sup>4)</sup>	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	0.2w/v%クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール擦式製剤	○ <sup>5)</sup>	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	0.2w/v%ベンザルコニウム塩化物エタノール擦式製剤	○ <sup>5)</sup>	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	76.9～81.4vol%エタノール擦式製剤	○ <sup>5)</sup>	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	フェノール	△		×	×	×	×	×	×		×	×	×	△	△	△	△
クレゾール	△	△	×	×	×	×	×	△		×	×	×	△	△	△	△	○
低	クロルヘキシジングルコン酸塩	○	○	×	○	×	×	×	○ <sup>6)</sup>	○ <sup>6)</sup>	×	×	△	△	△	△	×
	ベンザルコニウム塩化物	△	△	○	△	○	○	○	◆	○			○	○	○	○	×
	ベンゼトニウム塩化物	△	△	○	△	○	○	○	◆	○	○ <sup>1)</sup>		○	○	○	○	×
	アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩	△	△	△	△	△							○ <sup>7)</sup>	○ <sup>7)</sup>	○ <sup>7)</sup>	○ <sup>7)</sup>	×
その他	アクリノール水和物		×	×	△ <sup>8)</sup>	△ <sup>8)</sup>	△ <sup>8)</sup>		△ <sup>8)</sup>		△ <sup>8)</sup>	×	×	×	×	×	
	オキシドール		×	×	○				×		×	○	○				×

○：使用に適する    △：場合により使用    ▲：承認された適用であるが、ごく限られた場合のみ使用    ×：適用外  
承認された適用には、○、△、または▲を記載    ◆：承認されていないが、場合により使用

- 1) 歯科用製剤のみ
- 2) 産科用製剤のみ
- 3) 口腔粘膜のみ
- 4) 0.5%のみ手指の消毒
- 5) 手指の消毒のみ
- 6) 界面活性剤の含有するもの(赤色タイプ)は、使用不可
- 7) 結核領域においては、0.2～0.5%溶液を用いる
- 8) 化膿局所のみ