

付録D 消毒薬使用濃度一覧 (添付文書に記載されている濃度)

水準		人 体											医療機器		室内・手術室	家具・器具・物品等 (食器、リネンを含む)	排泄物		
		手指・皮膚	手術部位(手術野)の皮膚	手術部位(手術野)の粘膜	皮膚の創傷部位	粘膜の創傷部位	感染皮膚面	熱傷皮膚面	腔	外陰・外性器皮膚	結膜囊	耳鼻咽喉(口腔粘膜)	歯根管領域	金属				非金属	
高	過酢酸													● 0.3%	● 0.3%				
	グルタラール													● 2 w/v%, 3.5% 0.5w/v%(麻醉装置等) 3 w/v%(内視鏡専用)	● 2 w/v%, 3.5% 0.5w/v%(麻醉装置等) 3 w/v%(内視鏡専用)				
	フタラール													● 0.55%	● 0.55%				
中	次亜塩素酸ナトリウム	▲ 100~500ppm (0.01~0.05%)	▲ 50~100ppm (0.005~0.01%)	▲ 50~100ppm (0.005~0.01%)									● 3% <sup>1)</sup>	▲ 200~500ppm (0.02~0.05%)	● 200~500ppm (0.02~0.05%)	● 200~500ppm (0.02~0.05%)	● 200~500ppm (0.02~0.05%)	● 1,000~10,000ppm (0.1~1%)	
	ポビドンヨード	● 7.5%	● 7.5% ● 10%	● 10%	● 10%	● 10%	● 10%	● 10%	● 5% <sup>2)</sup>	● 5% <sup>2)</sup>		● 7%の15~30倍希釈 <sup>3)</sup>							
	ヨードチンキ	● 5~10倍希釈			▲ 5~10倍希釈							▲ (5~10倍希釈) <sup>3)</sup>	● 5~10倍希釈						
	エタノール	● 76.9~81.4 vol%	● 76.9~81.4 vol%											● 76.9~81.4 vol%	▲ 76.9~81.4 vol%				
	イソプロパノール	● 70 vol% ● 50 vol%												● 70 vol% ● 50 vol%	▲ 70 vol% ▲ 50 vol%				
	イソプロパノール添加エタノール液	● 原液												● 原液	▲ 原液				
	1 w/v%クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール液	● 原液	◆																
	0.5w/v%クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール液		● 原液											● 原液	▲ 原液				
	1 w/v%・0.5w/v%クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール擦式製剤	● 原液 <sup>4)</sup>																	
	0.2w/v%クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール擦式製剤	● 原液 <sup>5)</sup>																	
	0.2w/v%ベンザルコニウム塩化物エタノール擦式製剤	● 原液 <sup>5)</sup>																	
	76.9~81.4 vol%エタノール擦式製剤	● 原液 <sup>5)</sup>																	
	フェノール	▲ 1.5~2%													▲ 2~5%	▲ 2~5%	▲ 2~5%	▲ 2~5%	● 3~5%
クレゾール	▲ 0.5~1%	▲ 0.5~1%							▲ 0.1%					▲ 0.5~1%	▲ 0.5~1%	▲ 0.5~1%	▲ 0.5~1%	● 1.5%	
低	クロルヘキシジングルコン酸塩	● 0.1~0.5%	● 0.1~0.5%		● 0.05%								▲ 0.1~0.5%	▲ 0.1~0.5%	▲ 0.05%	▲ 0.05%			
	ベンザルコニウム塩化物	▲ 0.05~0.1%	▲ 0.1% 5分洗後 0.2%塗布	● 0.01~0.025%	▲ 0.01~0.025%	● 0.01~0.025%	● 0.01%		● 0.02~0.05%	◆	● 0.01~0.05%		● 0.1%	● 0.1%	● 0.05~0.2%	● 0.05~0.2%			
	ベンゼトニウム塩化物	▲ 0.05~0.1%	▲ 0.1% 5分洗後 0.2%塗布	● 0.01~0.025%	▲ 0.01~0.025%	● 0.01~0.025%	● 0.01%		● 0.025%	◆	● 0.02%	● 0.004% <sup>1)</sup>		● 0.1%	● 0.1%	● 0.05~0.2%	● 0.05~0.2%		
	アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩	▲ 0.05~0.2%	▲ 0.1% 5分洗後 0.2%塗布	▲ 0.01~0.05%	▲ 0.01~0.05%	▲ 0.01~0.05%							● <sup>7)</sup> 0.05~0.2% 結核領域 0.2~0.5%	● <sup>7)</sup> 0.05~0.2% 結核領域 0.2~0.5%	● <sup>7)</sup> 0.05~0.2% 結核領域 0.2~0.5%	● <sup>7)</sup> 0.05~0.2% 結核領域 0.2~0.5%			
その他	アクリノール水和物				▲ <sup>8)</sup> 0.05~0.2%	▲ <sup>8)</sup> 0.05~0.2%	▲ <sup>8)</sup> 0.05~0.2%					▲ <sup>8)</sup> 0.05~0.1%							
	オキシドール				● 原液あるいは2~3倍希釈							● 原液あるいは2~10倍希釈(口腔粘膜の消毒には原液又は2倍希釈)	● 原液又は2倍希釈						

● : 使用に適する  
▲ : 場合により使用  
▲ : 承認された適用であるが、ごく限られた場合のみ使用  
◆ : 承認されていないが、場合により使用する濃度  
1) 歯科用製剤のみ  
2) 産科用製剤のみ  
3) 口腔粘膜のみ  
4) 0.5%のみ手指の消毒  
5) 手指のみ  
6) 界面活性剤の含有するもの(赤色タイプ)は、使用不可  
7) 結核領域においては、0.2~0.5%溶液を用いる  
8) 化膿局所のみ